この説明文書は、ご使用の前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

尿素20%＋かゆみ止め成分W配合乳液　第2類医薬品

ラクケストDXローション 120g

[特長]

ガサガサした手、ザラザラした肌、硬くなったひざやかかとは、皮ふ表面の角質層の水分が不足しているのが原因です。

こんな時にラクケストDXローションを皮ふによく擦り込んでお使いください。尿素の作用により、角質層内の水分を適度に調節し、乾燥による手のあれ、ひざ・かかとなどの角化やザラザラした皮ふの状態を改善するとともに、2種類のかゆみ止め成分の作用により、皮ふの乾燥によるかゆみをおさえます。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1.次の人は使用しないでください

（1）本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。

2.次の部位には使用しないでください

（1）目の周囲、粘膜等。
（2）引っかき傷等の傷口、亀裂（ひび割れ）部位。
（3）かさぶたの様に皮ふがはがれているところ。
（4）炎症部位（ただれ、赤くはれているところ）。

相談すること

1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

（1）医師の治療を受けている人。
（2）本人または家族がアレルギー体質の人。
（3）薬によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

（1）使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

（2）2週間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症）

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

(1)定められた用法・用量を守ってください
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
(3)小児（15歳未満）に使用させないでください
(4)外用にのみ使用してください

【成分・分量】

本品100g中
尿　素……20g
リドカイン……2g
ジフェンヒドラミン……1g
グリチルレチン酸……0.3g
トコフェロール酢酸エステル……0.5g
添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ℓ-メントール、香料

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
(2)小児の手の届かない所に保管してください
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)キャップの閉め方が不十分な場合、ローションが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三友薬品株式会社　お客様相談室　電話03-3899-9333
受付時間　午前9：00～午後5：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元
三　友　薬　品　株　式　会　社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

I229-087B